

## 2. Deficiența de auz



### **4. Cauzele apariției deficienței de auz**

Cele mai frecvente cauze ale apariției deficienței de auz sunt:

- vârsta - diminuarea acuității auditive datorită îmbătrânirii poartă denumirea de prezbiacuzie
- afecțiuni tumorale
- leziuni ale cohleei
- infecții: meningita, paritidita epidemică (oreion)
- infecții congenitale: rubeola, toxoplasmoza, citomegalvirus, herpes, sifilis
- infecții virale
- intoxicația medicamentoasă-medicamentele ototoxice
- otitele
- perforarea timpanului
- obstrucția conductului auditiv extern din cauza dopului de cerumen (ceara)
- variații bruște de presiune în timpul zborului, înotului, exercițiilor intense
- traumatisme sonore- zgomotele puternice (de peste 90 dB)

Mai multe informații despre cauzele deficienței de auz puteți găsi la:

<http://www.romedic.ro/hipoacuzie/cauze>

<http://www.orlonline.ro/archives/558>

<http://www.audionova.ro/auzul-si-hipoacuzia/>

[http://rmr.medica.ro/reviste\\_med/download/rmr/2011.1/RMR\\_Nr-1\\_2011\\_Art-6.pdf](http://rmr.medica.ro/reviste_med/download/rmr/2011.1/RMR_Nr-1_2011_Art-6.pdf)